Diagnóstico de la **osteoartrosis** en medicina felina

La osteoartrosis (OA) es una enfermedad degenerativa que afecta a las articulaciones de los gatos, caracterizada por un bajo grado de inflamación. Esto la distingue de otras patologías articulares, como las inmunomediadas o sépticas, que presentan un alto nivel inflamatorio.

Prevalencia y detección temprana

La OA es sorprendentemente común en los gatos, con estudios que muestran que cerca del 40% de los felinos de todas las edades y el 90% de gatos mayores de 12 años, pueden estar afectados.[1] Aunque generalmente se asocia con gatos mayores, es importante estar atentos a la posibilidad de esta enfermedad en gatos más jóvenes.

Importancia del comportamiento

El cambio en el comportamiento es el indicio principal de OA en los gatos, aunque frecuentemente pasa desapercibido tanto para los veterinarios como para los tutores de los felinos. En este sentido, la observación del comportamiento y la realización de preguntas específicas y bien formuladas son herramientas esenciales para la detección temprana de la OA.

Herramientas diagnósticas

La clave para un diagnóstico efectivo es el uso de un cuestionario específico que consta de seis preguntas sencillas. Este cuestionario ha demostrado una sensibilidad y especificidad del 99% en tutores informados lo que lo convierte en una herramienta extremadamente valiosa.

Estas preguntas deben ser parte de cualquier consulta veterinaria rutinaria, ya que permiten detectar la OA incluso en gatos que acuden por motivos aparentemente no relacionados.[2]

Las preguntas que se incluyen en el cuestionario son:

- "¿Tu gato salta como antes?"
- "¿Tu gato baja como antes?"
- "¿Tu gato corre como antes?"
- "¿Tu gato persigue objetos como antes?"
- "¿Tu gato sube escaleras como antes?"
- "¿Tu gato baja escaleras como antes?"

Además del cuestionario, el diagnóstico de OA puede apoyarse en estudios radiográficos. Es importante recordar que la OA felina es una enfermedad primaria a diferencia del perro que es secundaria, y puede afectar a múltiples articulaciones, por lo que un examen radiográfico completo de todas las articulaciones es fundamental para un diagnóstico preciso.

Un ensayo terapéutico puede ayudar a confirmar el diagnóstico. Una respuesta positiva a un ensayo terapéutico con Solensia® en un gato puede confirmar la existencia de OA en el paciente felino.[4]

Tratamiento de la OA felina

Es importante recordar que la OA es una enfermedad progresiva que requiere un manejo continuo.

Para hacer un correcto abordaje terapéutico y mejorar la calidad de vida de los gatos con OA es esencial realizar un tratamiento multimodal teniendo en cuenta:

Solensia®
Frunevetmab



El PRIMER y ÚNICO anticuerpo monoclonal para el alivio del dolor por osteoartrosis (OA) felina

*Más de 5 millones de dosis**

TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA

Solensia* está considerado uno de los tratamientos de **primera línea para gatos** con dolor por OA leve, moderada o severa. Según la WSAVA[1] y AAHA[2].

EFICACIA

Solensia* posee un mecanismo de acción diferenciador que **neutraliza el factor de crecimiento nervioso (FCN) sobreexpresado** en las articulaciones enfermas, **sin interacciones conocidas.**

CONVENIENCIA

Proporciona un alivio continuado del dolor por OA durante un mes, tras una inyección subcutánea, permitiendo **una mejor continuidad del tratamiento.**

Si quieres saber más visita la web

#LibresdeDolor

Ficha Técnica

En caso de duda, consulte con su veterinario

*Datos globales internos de Zoetis hasta el 30 de Junio 2024.

1. B. P. Monteiro et al, 2022 WSAVA guidelines for the recognition, assessment and treatment of pain. JSAP, April 2023, Vol 64. **2.** M. E. Gruen et al, 2022 AAHA Pain Management Guidelines for Dogs and Cats. J Am Anim Hosp Assoc, 58:55–76. DOI 10.5326/JAAHA-MS-7292.

zoetis

Descarga la guía

Para saber más visita

https://www2.zoetis.es/libresdedolor/osteoartritis-gatos/diagnostico-tratamiento/diagnostico-oa-en-medicina-felina

- Analgesia, como base del tratamiento multimodal. Aquí es donde Solensia® cobra especial relevancia, demostrando ser una opción muy conveniente por su perfil de eficacia y seguridad, mejorando la continuidad del tratamiento.[5,6]
- Control del peso. Mantener o recuperar un índice de condición corporal adecuado es esencial para el tratamiento del dolor crónico en los gatos.[7]
- Nutracéuticos. Se recomiendan las dietas ricas en ácidos grasos omega-3, por sus beneficios positivos sobre la salud articular.[8]
- Modificación ambiental. Modificar el entorno del gato le ayudará a realizar las actividades cotidianas con un menor esfuerzo.

La aparición de Solensia® (un anticuerpo monoclonal específico para el tratamiento del dolor asociado con la OA) ha revolucionado el manejo de esta enfermedad en los gatos. Solensia® permite un control eficaz del dolor hasta cuatro semanas, mejorando significativamente la calidad de vida de los gatos afectados.[3]

Referencias

1. Lascelles BDX et al. Cross-sectional study of the prevalence of radiographic degenerative joint disease in domesticated cats. Vet Surg. 2010 Jul;39(5):535-44.
2. Enomoto M et al. Development of a checklist for the detection of degenerative joint disease-associated pain in cats. J Feline Med Surg. 2020 Dec;22(12):1137-1147.
3. Reid J, Gildea E, Davies V, Thompson J, Scott M. Measuring the effect of the anti-nerve growth factor antibodies bedinvetmab and frunevetmab on quality of life in dogs and cats with osteoarthritis using a validated health-related quality of life outcome measure: an observational real-world study. Front Vet Sci. 2024 Aug 14;11:1395360. doi: 10.3389/fvets.2024.1395360.
4. Calvo I., et al., Diagnóstico de la OA felina y comunicación con el propietario. Guía de Manejo de la OA Felina en la nueva era. Zoetis, 2022; (3):22-33.
5. B. P. Monteiro et al, 2022 WSAVA guidelines for the recognition, assessment and treatment of pain. JSAP, April 2023, Vol 64. M. E. Gruen et al, 2022 AAHA Pain
6. Management Guidelines for Dogs and Cats. J Am Anim Hosp Assoc, 58:55–76. DOI 10.5326/JAAHA-MS-7292
7. Epstein M, Rodan I, Griffenhagen G, et al. 2015 AAHA/AAFP pain management guidelines for dogs and cats. J Feline Med Surg. 2015;17(3):251-272.
8. Goggs R, Vaughan-Thomas A, Clegg PD, et al. Nutraceutical therapies for degenerative joint diseases: a critical review. Crit Rev Food Sci Nutr. 2005;45(3):145-164.

La osteoartrosis (OA), como su nombre indica, es una enfermedad **de base no inflamatoria,** degenerativa y progresiva de las articulaciones cuyo principal signo clínico es el **dolor crónico.**

A diferencia del perro, en los gatos la osteoartrosis suele ser una **enfermedad de origen PRIMARIO.**

Solensia®
Frunevetmab

Cerca del 90%
de los gatos mayores de 12 años muestran evidencias radiográficas de osteoartrosis.[3]

Cerca del 40%
de los gatos de todas las edades tienen signos clínicos de osteoartrosis.[3]

RECOMENDACIONES SEGÚN LOS EXPERTOS

EDUCACIÓN DE LOS TUTORES

Cuestionario de detección

Conseguimos una sensibilidad del ~99% y una especificidad del 100% en tutores informados sobre la OA.[3]

Confirmación radiográfica

En todos los casos se recomienda hacer un estudio ortopédico y radiográfico **no solo de una articulación, sino de todas.[4]**

Ensayo terapéutico con Solensia®

Una respuesta positiva a un ensayo terapéutico de Solensia® en un gato **puede confirmar la existencia de OA.[4]**

La búsqueda proactiva de la OA es clave para mejorar y recuperar su calidad de vida.

Solo el 13% de los gatos con OA se diagnostican actualmente

PORQUE NADIE DEBERÍA SUFRIR EN SILENCIO, ESTÁ EN TUS MANOS CAMBIAR ESTA SITUACIÓN.

3. Enomoto et al, Development of a checklist for the detection of degenerative joint disease-associated pain in cats. *Journal of Feline Medicine and Surgery* 2020, Vol. 22(12) 1137–1147. DOI: 10.1177/1098612X20907424.

4. Calvo I., et al., Diagnóstico de la OA felina y comunicación con el propietario. Guía de Manejo de la OA Felina en la nueva era. Zoetis, 2022; (3):22-33

zoetis